

26. World Health Organization (WHO). UNICEF. Protecting, promoting and supporting breastfeeding in facilities providing maternity and newborn services: the revised Baby-Friendly Hospital Initiative implementation guidance. Geneva: WHO; 2018.
27. Moon RY. Task Force on Sudden Infant Death Syndrome. SIDS and other sleep-related infant deaths: evidence base for 2016 updated recommendations for a safe infant sleeping environment. *Pediatrics*. 2016;138:e20162940.
28. Psaila K, Foster JP, Pulbrook N, Jeffery HE. Infant pacifiers for reduction in risk of sudden infant death syndrome. *Cochrane Database Syst Rev*. 2017;4:CD011147.
29. Hauck FR, Thompson JM, Tanabe KO, Moon RY, Venemann MM. Breastfeeding and reduced risk of sudden infant death syndrome: a meta-analysis. *Pediatrics*. 2011;128:103–10.
30. Buccini G, Venancio SI. Uso de chupeta em crianças amamentadas: prós e contras. *Sociedade Brasileira de Pediatria*. 2017. Available from: https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/Aleitamento-Chupeta_em_Crianças_Amamentadas.pdf [cited 30.05.19].
31. Lopes AG, Pereira AC, Fonseca EPd, Mialhe FL. Irregularidades sanitárias na promoção comercial em rótulos de produtos para lactentes e os riscos para a saúde. *Saúde em Debate*. 2017;41:539–52.
32. Sertório SC, Silva IA. As faces simbólica e utilitária da chupeta na visão de mães. *Rev Saude Publica*. 2005;39:156–62.

Gabriela Buccini ^{a,*}, Rafael Pérez-Escamilla ^a
e Sonia I. Venancio ^b

^a *Yale School of Public Health, New Haven, Estados Unidos*

^b *Instituto de Saúde, São Paulo, SP, Brasil*

* Autor para correspondência.

E-mail: gabriela.buccini@yale.edu (G. Buccini).
2255-5536/

© 2019 Sociedade Brasileira de Pediatria. Publicado por Elsevier Editora Ltda. Este é um artigo Open Access sob uma licença CC BY-NC-ND (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>).

Routine pacifier use in infants: pros and cons[☆]



Uso rotineiro de chupeta por bebês: prós e contras

Caro Editor,

Meu editorial intitulado “Uso rotineiro de chupeta por bebês: prós e contras”, publicado na edição de março/abril de 2019 do *Jornal de Pediatria*,¹ destacou a recomendação conflitante da *American Academy of Pediatrics* (Academia Americana de Pediatria – AAP) em oposição aos 10 Passos para o Sucesso da Amamentação da Organização Mundial de Saúde /Fundo das Nações Unidas para a Infância (OMS/Unicef) quanto ao uso de chupeta. Como observado, a AAP recomenda o uso rotineiro de chupeta na hora de dormir, uma vez estabelecido o aleitamento materno (geralmente três a quatro semanas de idade),² em oposição ao categórico Passo 9 da OMS/Unicef, que diz: “Não ofereça bicos artificiais ou chupetas para bebês amamentados”.³

É importante notar que, desde que escrevi o editorial, o programa 10 Passos da OMS/Unicef foi revisado e o Passo 9 agora declara “Aconselhar as mães sobre o uso e os riscos de mamadeiras, bicos artificiais e chupeta”.⁴

Embora não endosse diretamente o uso rotineiro de chupetas, essa afirmação se retrai da proibição categórica

anterior e é mais consistente com o consenso (como mostrado em meu editorial) de que os benefícios do uso rotineiro de chupetas na redução do risco da síndrome da morte súbita infantil (SIDS) e como reforço de um efeito calmante sobre o comportamento infantil supera quaisquer riscos teóricos não comprovados.

Conflitos de interesse

O autor declara não haver conflitos de interesse.

Referências

1. Eidelman AI. Routine pacifier use in infants: pros and cons. *J Pediatr* (Rio J). 2019;95:121–3.
2. Moon RY. Task force on sudden infant death syndrome, SIDS and other sleep related infant deaths: evidence base for 2016 updated recommendations for a safe infant sleeping environment. *Pediatrics*. 2016;138, pii:e20162940.
3. Saadwh R, Akre J. Ten steps to successful breastfeeding: a summary of the rationale and scientific evidence. *Birth*. 1996;23:154–60.
4. Baby Friendly Hospital Initiative. 10 steps to successful breastfeeding. Available from: https://www.unicef.org/nutrition/index_breastfeeding-ten-steps.html [cited 29.05.19].

Arthur I. Eidelman 

Hebrew University School of Medicine, Shaare Zedek Medical Center, Jerusalem, Israel

E-mail: arthur.eidelman@gmail.com

2255-5536/

© 2019 Publicado por Elsevier Editora Ltda. em nome de Sociedade Brasileira de Pediatria. Este é um artigo Open Access sob uma licença CC BY-NC-ND (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>).

DOIs of original articles:

<https://doi.org/10.1016/j.jped.2018.03.002>,

<https://doi.org/10.1016/j.jped.2019.06.002>.

[☆] Como citar este artigo: Eidelman AI. Routine pacifier use in infants: pros and cons. *J Pediatr* (Rio J). 2019;95:621.